

## 正の偶数に対するζ関数の値

**Theorem.** ζ関数ζ(s)を

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (\operatorname{Re} s > 1)$$

とすると、 $m \in \mathbb{N}$ に対して


$$\zeta(2m) = \frac{(-1)^{m-1} 2^{2m-1} B_{2m} \pi^{2m}}{(2m)!}$$

が成り立つ。ここで、 $B_m$ はBernoulli数である。

**Proof.**  $f(z) = \frac{z}{e^z - 1}$ は $z = 0$ のまわりで、 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} z^n$ とLaurent展開できる

ことに注意する。 $n \geq 2$ に対して $f_n(z) = \frac{z}{e^z - 1} \cdot \frac{1}{z^{n+1}}$ とすると $f_n(z)$ の極は $z = 2l\pi i$  ( $l \in \mathbb{Z}$ )であり、 $l \neq 0$ のときは $z = 2l\pi i$ は1位の極であり、 $z = 0$ は $n+1$ 位の極である。

ここで、 $N \in \mathbb{N}$ に対して以下の積分路 $C_N$ に沿った $f_n(z)$ の積分を考える。ここで、 $R_N = (2N+1)\pi$ である。



このとき留数定理より

$$\int_{C_N} f_n(z) dz = 2\pi i \sum_{l=-N}^N \operatorname{Res}(f_n; 2l\pi i) = 2\pi i \operatorname{Res}(f_n; 0) + 2\pi i \sum_{0 < |l| \leq N} \operatorname{Res}(f_n; 2l\pi i)$$

がなりたつ。ここで

$$\operatorname{Res}(f_n; 0) = \frac{1}{n!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^n}{dz^n} z^{n+1} f_n(z) = \frac{1}{n!} \lim_{z \rightarrow 0} f^{(n)}(z) = \frac{B_n}{n!}$$

である. ただし最後の等号は  $f(z)$  の Laurent 展開係数より成り立つことがわかる. また,  $l \neq 0$  のとき

$$\operatorname{Res}(f_n; 2l\pi i) = \lim_{z \rightarrow 2l\pi i} \frac{z - 2l\pi i}{e^z - 1} \frac{1}{z^n} = \frac{1}{(2l\pi i)^n}$$

であるから

$$\int_{C_N} f_n(z) dz = 2\pi i \left\{ \frac{B_n}{n!} + \sum_{0 < |l| \leq N} \frac{1}{(2l\pi i)^n} \right\}$$

となる. ここで,  $n$  が奇数のときは右辺第二項が 0 になるから,  $n$  が正の偶数つまり  $n = 2m$  ( $m \in \mathbb{N}$ ) のときを考えると

$$\int_{C_N} f_{2m}(z) dz = 2\pi i \left\{ \frac{B_{2m}}{(2m)!} + 2 \sum_{l=1}^N \frac{1}{(2l\pi)^{2m} (-1)^m} \right\}$$

のように書き直すことができる.

次に,  $N \rightarrow \infty$  のとき  $\int_{C_N} f_{2m}(z) dz \rightarrow 0$  を示す. 三角不等式から

$$\left| \int_{C_N} f_{2m}(z) dz \right| \leq \int_{C_N} |f_{2m}(z)| |dz| \leq \sup_{z \in C_N} |f_{2m}(z)| \cdot 4(2N+1)\pi$$

がわかる. 正方形状の  $C_N$  を各辺に分解して  $\sup_{z \in C_N} |f_{2m}(z)|$  を評価する.

(i)  $z = R_N + ti$  ( $-R_N \leq t \leq R_N$ ) のとき, ある定数  $M_1 > 0$  に対して

$$|f_{2m}(z)| \leq \frac{1}{|z|^{2m}} \frac{1}{|e^z - 1|} \leq \frac{1}{(R_N)^{2m}} \frac{1}{e^{R_N} - 1} \leq \frac{M_1}{N^{2m}}$$

が成り立つ.

(ii)  $z = -R_N + ti$  ( $-R_N \leq t \leq R_N$ ) のとき, ある定数  $M_2 > 0$  に対して

$$|f_{2m}(z)| \leq \frac{1}{|z|^{2m}} \frac{1}{|e^z - 1|} \leq \frac{1}{(R_N)^{2m}} \frac{1}{1 - e^{-R_N}} \leq \frac{M_2}{N^{2m}}$$

が成り立つ.

(iii)  $z = t \pm R_N i$  ( $-R_N \leq t \leq R_N$ ) のとき, ある定数  $M_3 > 0$  に対して

$$|f_{2m}(z)| \leq \frac{1}{|z|^{2m}} \frac{1}{|e^z - 1|} \leq \frac{1}{(R_N)^{2m}} \frac{1}{e^t + 1} \leq \frac{1}{(R_N)^{2m}} \frac{1}{e^{-R_N} + 1} \leq \frac{M_3}{N^{2m}}$$

が成り立つ.

(i) から (iii) より  $\sup_{z \in C_N} |f_{2m}(z)| \leq \frac{M}{N^{2m}}$  ( $M > 0$ ) が成り立つことがわかる.

ゆえに

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left| \int_{C_N} f_{2m}(z) dz \right| \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{4M(2N+1)\pi}{N^{2m}} = 0$$

となるから,  $N \rightarrow \infty$  とすると

$$\frac{B_{2m}}{(2m)!} + 2 \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{(2l\pi)^{2m} (-1)^m} = 0$$

が成り立ち,これを  $\zeta(2m)$  について解くと

$$\zeta(2m) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2m}} = \frac{(-1)^{m-1} 2^{2m-1} B_{2m}}{(2m)!} \pi^{2m}$$

となる. ■